

Farliga saker för Din lilla hund



Vad hunden inte ska äta:

* **Choklad.** Farligast är den mörka chokladen

Teobromin är mycket giftigt för hundar. En choklad tillverkad av stark kakao kan orsaka symtom, även om hunden bara äter en relativt liten mängd. 20 milligram teobromin per kilo kroppsvikt räcker för att ge förgiftning och den tiodubbla mängden kan vara dödlig.

Översatt till mer lättbegriplig mängd, innebär det att en normalstor (100 gram) ljus chokladkaka faktiskt kan döda en dvärghund och förgifta en hund upp till retrieverstorlek.

Samma mängd av den mörkaste chokladen kan förgifta en hund av vilken storlek som helst - även en sankt bernhardshund. Den kan vara dödlig för en hund av storlek som en cocker spaniel.

Upprepad förtäring ger kraftigt ökad risk eftersom hundar bryter ner teobromin långsamt. Arton timmar efter intaget har bara halva mängden lämnat kroppen.

Symtom vid chokladförgiftning

Symtomen på chokladförgiftning är psykisk oro och rastlöshet, hjärtklappning och hastig andning. Oron kan övergå i överaktivitet, svårighet att samordna rörelserna, muskeldarrningar, kramp i en eller flera muskler eller kramp i hela kroppen. I de mer allvarliga fallen får hunden epilepsilika anfall och/eller kan förlora medvetandet.

Teobromin (liksom kaffe) sätter fart på magen och kan orsaka diarré och kräkning. Teobromin (liksom kaffe) ökar urinproduktionen. Hunden blir kissnödig, alternativt kan den kissa på sig, och kompenserar den ökade urinavgången genom att dricka mer än vanligt.

Vid misstanke om förgiftning

Om du misstänker att din hund råkat ut för chokladförgiftning, bör en veterinär kontaktas omedelbart.

Man bör försöka att räkna ut hur mycket ren choklad hunden ätit och av vilken sort. Ljusa fyllda praliner är betydligt mindre farliga än motsvarande mängd ren, mörk choklad från till exempel Belgien.



* **Gul eller röd lök.** Löken ger skadeverkan på hundens hemoglobin och att den tilltar gradvis, därför är små bitar under en längre tid oftast farligare än att äta en hel lök om inte hunden är väldigt liten förståss (tänker på varje träningstillfälle med dessa köttbullar.

Hämmar syreupptagningen i blodet och sänker prestationsförmågan.


* **Alkohol.** Försvagar hjärnans funktion och kan leda till koma



* **Kaffe.** Koffeinet i en kopp kaffe är en kemisk förening - metylxantin - som kan ge höjd puls och orsaka slaganfall. Så se upp med koppar som står framme med en liten skvätt kvar.



* **Vitlök:** Bryter ned hundens röda blodkroppar vilket kan leda till blodbrist och njursvikt till följd av brist på hemoglobin.



* **Vindruvor och russin:** Toxikologer har upptäckt att dom kan ge hunden njursvikt. Varför vet man dock inte ännu! Endast några få vindruvor eller russin kan leda till att hunden avlider. Så lite vindruvor som 4,7 gram per kroppskilo har visat sig kunna vara dödligt.

Diffusa symtom

Efter ca två timmar brukar den förgiftade hunden kräkas. Symtom som diarré och trötthet kommer efter fem till sex timmar. Eftersom de första symtomen är diffusa dröjer det oftast upp till flere dygn innan ägaren förstår att hunden är förgiftad. Akuta njurbesvär visar sig genom att hunden mister aptiten, får blod i urinen och visar tecken på smärta. En del hundar har helt slutat producera urin och vid flere fall har hundar blivit så dåliga att de avlidit eller att man avlivat dem. I de fall där hundar klarat sig,

har symtomen försvunnit inom några dagar. I sällsynta fall har det dröjt upp till flera veckor innan hunden tillfrisknat.

Behandling i tid

Det är viktigt att hunden får behandling så fort som möjligt. Om den inte självmant kräks upp vindruvorna eller russinen, så kan en veterinär ge medel som tvingar hunden att spy. Aktivt kol, som binder maginnehållet så att eventuella gifter inte tas upp av kroppen, har provats vid flera tillfällen. Hunden kan behöva dropp under ett par dygn för att få i sig vätska intravenöst. Det minskar risken för framtida problem med njurarna. Under de första dagarna bör blodprover tas regelbundet och mediciner kan vara nödvändiga.



* **Macadamianötter.** Bara några stycken av dessa kan ge skakningar och ibland tillfällig förlamning i en hunds bakben.

* **Godis och tuggummi, som innehåller Xylitol** gör att hundens blodsocker sjunker och kan ge hunden kräkningar följt av svaghet, svårigheter att gå, kollaps och slaganfall till följd av detta!! För en lite hund på ca två kilo räcker det med en mycket liten mängd för att detta ska kunna inträffa. Xylitol finns ju även i bakverk, godis och allt möjligt "osötat"





* Nikotin

Fimpar, cigarettpaket, snus och i viss mån tuggummi (nikotin)

Kan tåla ett par cigaretter innan djuret blir förgiftat. Snus däremot ger symtom tidigare, det tas lättare upp av kroppen

SYM TOM

Kräkning

Slöhet

Hjärtpåverkan

Andningspåverkan

ÅTG ÄRD

Vätsketillförsel

Man skall ej kräka hunden (om den är nedsatt) för den kan dra ner det i lungorna.

Är hunden inte nedsatt kan man ge salt (lite och en gång) för att kräka hunden.

Förebyggande genom att inte ha tobak tillgängligt för hunden.

Späd ut giftet (ej om hunden är nedsatt) med ev. mat.

1:skedet - kräka hunden

2:skedet - späda ut giftet.

* Vetedeg

Förvaras oåtkomligt för djuren

Hundar blir berusade om degen jäser i magen

INTE DÖDLIGT, håll hunden under uppsikt.

Kontakta veterinär!

Hunden skall vara så still som möjligt, annars kan det orsaka magomvridning.



* Växter

Krukväxter med vitaktig saft är giftiga.

Julstjärnor är giftiga.

High chaparall kaktusar är giftiga.

De giftiga växterna ger en irritation på hud och slemhinnor.

Man skall skölja ur munnen på djuret.

SYM TOM

Kräkning och diarré



*
*
*

* Svampar (utomhussvampar)

Olika symtom beroende på svampens giftighet.

SYM TOM

Kräkningar och diarré

Kan påverka centrala nervsystemet (nedsatt, hängig, drägglig)

Njur- och leverpåverkan



RÖD FLUGSVAMP

Giftet heter muska-(rin)(nin)

Motgiftet finns och heter Atropin



* Blågröna alger



Det är viktigt att hunden inte tillåts dricka eller bada i "blommande" vatten för det kan leda till döden.

SYMPTOM

Kräkning

Diarré

Uttorkning

Gulsot (symtom på att levern är skadad)

Obduktion visar svår lever- och njurskada kan resultera i gastrit och entrit. (mag- och tarminflammation med blödning)

Små mängder vid upprepade tillfällen kan ge kroniska lever och njurskador.

Ämnet utsöndras inte utan lagras i kroppen.



* Viktigt

Om djuret har ätit vassa föremål t.ex. kapsyl, spik och glas så rekommenderar man sparris, för det trådar sig runt föremålet.

* Tänk på att utomhus.....

Viktigt är att alltid ha sin hund kopplad om man inte kan lita 100% på den och vem kan det? Trafiken dödar och får hunden upp ett spår eller ser något roligt längre bort så är det nästan omöjligt att stoppa deras framfart, för tyvärr är ju sällan husse eller matte roligare än en kanin som plötsligt bestämt sig för att springa just framför hunden. Noffar jagar gärna, det är de ju framtagna för, men kommer de ner i ett kaninhål så kommer de kanske inte ut och kommer de framför en bil så har de ingen chans



* Noffar älskar ofta att **jaga bilar**. Tänk på detta om Du använder flexikoppel. Risken är överhängande att den blir påkörd om man inte är alert hela tiden och flexikopplets låsfunktion kan ju faktiskt sluta fungera. Så i trafikerad miljö använd vanligt koppel



* Noffar, och förresten alla hundar och katter, gillar **glykol**. Det är sött och gott och direkt dödligt




* Noffar är mycket förtjusta i vatten så passa dem vid en bassäng eller damm. Lätt att komma i men ofta omöjligt att ta sig ur själv. **Drunkning** är inte ovanligt



Inomhus.....

* Noffar **biter** gärna på sladdar och vad som detta leder till är ju lätt att förstå.



* Noffar biter gärna på annat också och blir den lämnad ensam hemma så kan det hända olyckor även med de bästa skorna, oerhört goda att tugga och luktar matte eller husse är de sedan i skinn också mmmm, möbler kan få sig en duvning och givetvis kan små olyckor hända. Så tänk på att lämna hunden rastad och mentalt trött med kanske ett gott tuggben, då elimineras risken för sådant.

